

FICHA TÉCNICA
PICLORAM M.A. COLOMBIA 101 SL
Registro Nacional ICA No. 1104
Titular del Registro: M.A. COLOMBIA S.A.S.

GENERALIDADES

Producto: PICLORAM 101 M.A. COLOMBIA SL
Tipo de producto: Herbicida de uso agrícola
Categoría Toxicológica: 3-Ligeramente Peligroso
Cultivo: Arroz y potreros
Presentación disponible: 4L y 20L

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PICLORAM M.A. COLOMBIA 101 SL es un Herbicida post-emergente sistémico, de acción hormonal, es absorbido por raíces y hojas y se trasloca por vía floemática y xilemática, actuando en los puntos de crecimiento. Controla malezas de hoja ancha anual y perenne. Se puede rociar en follaje, inyectar en las plantas, aplicado para cortar superficies, o colocar en la base de la planta en donde lixiviará a las raíces. Absorbido una vez por el follaje, el vástago, o las raíces, recomendado para el control de malezas de hojas anchas y ciperáceas el cual produce una torcedura y curvatura (epinastia) de las plantas de hojas anchas. Al ser tratadas con Picloram, estas plantas generalmente desarrollan hojas, tallos y raíces mal formadas. El compuesto se concentra en los tejidos jóvenes ya sea embrionariamente o meristemáticas los cuales crecen rápidamente. Estos tejidos se ven más afectados que los tejidos más maduros o relativamente inactivos.

COMPOSICIÓN

Ingrediente activo:
Picloram.....**64g/L**
4-amino-3,5,6-trichloro-2-pyridinecarboxylic acid, de formulación a 20°C

2,4-D.....**240g/L**
Ácido (2,4-Dihlorofenoxi) acético de formulación a 20°C

Ingredientes aditivos:.....**c.s.p. 1 L**

RECOMENDACIONES DE USO

“Consulte con un Agrónomo o Ingeniero Agrónomo”

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS	P.C.	P.R.
Arroz	Barba de indio (Fimbristylis annua), Coquito (Cyperus rotundis) Verdolaga (Portulaca linfolia), Calidium esculenta (rascadera, papa china), Lirio rojo (Crocasmia kacknepis), Batatillas, Betillas, Bejucos, Campanillas (Ipomoea hista), Trompetica (Mirabilis jalapa) Helecho, Helecho macho, (Pteridium aquilinum), Romasa, Lengua de vaca (Rumex crispus), Escoba, escoba babosa, Escoba negra, Garrapatilla (Sida rhombifolia), Yerba de paso, Verdolaga de cabra, Lechua de platanera (Talinum paniculatom), Enea, Junco, Totcra (Typha angustifolia),	0.75 L/ha	N.A.	24 horas después de la aplicación

FICHA TÉCNICA
 PICLORAM M.A. COLOMBIA 101 SL
 Registro Nacional ICA No. 1104
 Titular del Registro: M.A. COLOMBIA S.A.S.

	Siempre viva morada, Taguachi (<i>Trasdescanfia cumanaensis</i>).			
Praderas	Alfarillo <i>Spergula arvensis</i> , Alpatezera <i>Scleranthus annuus</i> , Bledo <i>Amaranthus</i> sp, Corazón herido <i>Polygonum nepalense</i> , Duraznillo <i>Polygonum segetum</i> , Foresteria <i>Silene gallica</i> , Hierba de cuy <i>Galinsoga parviflora</i> , Llantén <i>Plantago lanceolata</i> , Malva blanca <i>Malvastrum peruvianum</i> , Malva morada <i>Malva silvestres</i> , Mostaza <i>Sinapsis nigra</i> , Nabo <i>Brassica napus</i> , Pacta <i>Rumex obtusifolius</i> , <i>Rumex crispus</i> lengua de vaca, Pactilla <i>Rumex acetosella</i> , Pajarera <i>Stellaria media</i> , Ortiga <i>Urtica urens</i> , Quimbilla <i>Lepidium chinchicara</i> , Rábano <i>Raphanus raphanistrum</i> , Taraxaco <i>Taraxacum officinale</i> , Tzera-tzera <i>lepidium bipinnatifidum</i> .	1.25L/ha	N.A.	24 horas después de la aplicación

P.C: Período de carencia. Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Período de reentrada. Intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas al área o cultivo tratado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

No aplique PICLORAM M.A COLOMBIA 101 SL cuando la velocidad del viento provoque el arrastre del producto a cultivos cercanos que son sensibles. Un viento transversal es deseable para facilitar un depósito uniforme.

Es posible aplicar PICLORAM M.A COLOMBIA 101 SL aun cuando las ciperáceas, hojas anchas y gramíneas están cubiertas por el rocío, sin embargo, una lluvia dentro de 3 a 6 horas después del tratamiento puede disminuir la eficiencia de PICLORAM M.A COLOMBIA 101 SL.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Las aplicaciones pueden efectuarse con cualquier equipo terrestre: bomba de espalda (mecánica o de motor); bombas estacionarias, equipos tractorizados, etc. Los equipos deben estar en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrados para obtener óptimos resultados. Se recomienda el uso de boquillas de abanico para herbicidas. Se recomienda usar un volumen que garantice un adecuado cubrimiento de la aplicación.

COMPATIBILIDAD Y FITOXOCIDAD

PICLORAM M.A. COLOMBIA 101 SL puede ser aplicado con la mayoría de los herbicidas. No aplicar con productos alcalinos por presentar antagonismo en el control de ciertas malezas. Evite la contaminación con agentes alcalinos, ácidos fuertes y agentes oxidantes.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se

FICHA TÉCNICA
PICLORAM M.A. COLOMBIA 101 SL
Registro Nacional ICA No. 1104
Titular del Registro: M.A. COLOMBIA S.A.S.

usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.



EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS 24 HORAS
CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá.
En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

Importado y Distribuido por:
M.A. COLOMBIA S.A.S.

MA[®]
COLOMBIA