

FICHA TÉCNICA
METSULFURON METHYL M.A. COLOMBIA 60 WG
Registro Nacional ICA No. PL0001312025
Titular del Registro: M.A. COLOMBIA S.A.S.

GENERALIDADES

Producto: METSULFURON METHYL M.A.
COLOMBIA 60 WG
Tipo de producto: Herbicida de uso agrícola
Categoría Toxicológica: 4-Ligeramente Peligroso
Cultivo: Arroz
Presentación disponible: 20G, 120G Y 1K

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

METSULFURON METHYL M.A. COLOMBIA 60 WG es un herbicida sistémico y residual para el control de malezas de hoja ancha. Metsulfuron Methyl pertenece al grupo químico de las Sulfonilureas. Es absorbido a través de las raíces y el follaje y se transloca hasta el ápice de las plantas. Actúa mediante la inhibición de la enzima sintasa acetolactato (ALS). Los síntomas son clorosis y enrojecimiento intervenal que se aprecian 1 a 3 semanas después de la aplicación, dependiendo de las condiciones ambientales, el tamaño y la susceptibilidad de la maleza.

COMPOSICIÓN

Ingrediente activo:
Metsulfuron Methyl.....600 g/Kg
2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamiysulfamoyl)benzoic acid, de formulación a 20 °C

Ingredientes aditivos:.....c.s.p. 1 Kilo

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	P.C.	L.M.R	P.R.
Arroz	Piñita (Murdannia nudiflora), Clavito (Jussiaea, linnifolia), Botoncillo (Caperonia palustris), Tripa de pollo (Euphorbia hirta), Lechosa (Euphorbi heterophylla), Botón blanco (Eclipta alba), Balsillo (Cochorus orinocensis), Batallita (Ipomoeae congesta), Pega-pega (Desmonium tortuosum), Buche de gallina (Heteranthera reniformis), Verdolaga (Portulaca oleracea), Palo de agua (Ammania coccinea), Suelda con suelda (Commelina difusa), Dormidera (Mimosa púdica), Falsa caminadora (Ichaemum rugosum), Chilinchif (Cassia tora).	20 g/ha	N.A.	0.01 mg/Kg	0 horas

P.C.: Período de carencia. Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R.: Período de reentrada. Intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas al área o cultivo tratado.

L.M.R.: Límite máximo de residuos. Fuente: European Commission.

N.A.: No aplica.

COLOMBIA

FICHA TÉCNICA
METSULFURON METHYL M.A. COLOMBIA 60 WG
Registro Nacional ICA No. PL0001312025
Titular del Registro: M.A. COLOMBIA S.A.S.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar la aplicación en post-emergencia, posterior al inicio de la temporada de lluvias dirigida a las malezas en crecimiento activo, cuando estas no hayan alcanzado el estado de floración. En pastos destinados a la obtención de semilla se debe aplicar antes del inicio del primordio floral, porque puede producir daño a la semilla. Rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción o grupo químico para evitar el desarrollo de malezas resistentes.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Se recomienda un volumen de agua de 200 Litros por hectárea. Use boquillas para herbicidas, como boquillas de abanico plano o cono lleno y a presión constante. Revise y calibre bien los equipos. Los equipos deben estar en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrados para obtener óptimos resultados.

COMPATIBILIDAD Y FITOXICIDAD

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas. No mezclar el producto con aguas o productos alcalinos ya que ocasionan su hidrólisis.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.



EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS 24 HORAS
CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá.
En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

Importado y Distribuido por:
M.A. COLOMBIA S.A.S.

COLOMBIA